

眼科部 Department of Ophthalmology

查詢或預約 · 歡迎聯絡我們

眼科部

香港跑馬地山村道二號
養和醫院李樹芬院四樓
電話：2835 8880 / 2835 8890
傳真：2892 7510
電郵：eye@hksh-hospital.com

辦公時間 (敬請預約)

星期一至星期五：上午九時至下午五時
星期六：上午九時至下午一時
星期日及公眾假期休息

www.hksh-hospital.com

© 香港養和醫院有限公司 版權所有

OPH.1151.HC-02-112015

眼瞼整形術



養和醫院
Hong Kong Sanatorium & Hospital

眼科部
Department of Ophthalmology

眼部的整形和重建手術是眼科的一個分枝。眼科醫生經過專科訓練，可以施行眼及眼眶之整形及重建手術。重建手術可適用於因外傷或眼眶腫瘤摘除而導致的眼瞼組織缺損、矯正因甲狀腺分泌失調而導致的眼睛毛病，如眼球突出或眼瞼過高。重建手術亦適用於患有鼻淚管腫瘤或阻塞及眼眶周邊骨折。

上眼瞼手術

在亞洲，眼瞼整形術較普遍，這與亞洲人多為單眼瞼有關。對年輕人士來說，雙眼瞼能使他們的眼睛看似較大。對年長人士來說，因為眼瞼皮膚鬆弛，引致上眼皮過長垂下，這不單影響外觀，也使視野受阻。施行眼瞼皮膚切除術後，他們不但樣子變得年輕，視野也因為減少多餘皮膚阻礙而增大。

年輕人士之雙眼瞼成形術，有兩種方法。第一種手術只需於上眼皮內縫三針線便成，這手術快捷，復原時間較短，但有時需要拆線，而且手術效果未必持久。第二種方法是於上眼皮內側切開皮膚後才縫合，這手術較複雜，但具持久性。

下眼瞼手術

「眼袋」是因為脂肪從皮下突出所致。有眼袋的人士常給人一種很疲倦及年老的感覺。現在最新的方法為經眼皮後施行下眼瞼手術。這方法是於眼瞼及眼球之間作一個切口，然後用二氧化碳激光將脂肪切除。由於使用二氧化碳激光，故可即時止血，並可減少出血機會，這手術最優勝之處為完全沒有疤痕，而眼瞼也不會有退縮的危險，因為手術並沒有觸及眼皮或眼肌肉，故此大大減少瘀黑的機會。手術後眼球及下眼瞼通常有數天輕微紅腫，病人只需休息兩天，便可以恢復工作。



下眼皮眼袋手術前



手術後一星期並無瘀血